

LEY DE VACUNACIÓN PARA ESTUDIANTES REQUISITOS SEGUN EDAD/GRADO AÑO ESCOLAR 2011-2012

Las siguientes son las vacunas mínimas que se requieren para cada nivel de edad/grado. Este no es un programa de vacunas recomendado para bebés y niños de edad preescolar. Para ese programa, consulte a su médico o al departamento de salud local.

Edad/Grado	Número de Dosis					
Pre Kinder (2 a 4 años)	4 DTP/DTaP/DT ²		3 Polio	3 Hep B	1 MMR ⁵ 1	Var ⁶
Grado K a 3 ¹ 4	DTP/DTaP/DT/Td ¹		4 Polio ⁴	3 Hep B	2 MMR ⁵ 2	Var ⁶
Grado 4 a 5	4 DTP/DTaP/DT/Td ²		4 Polio ⁴	3 Hep B	2 MMR ⁵ 1	Var ⁶
Grado 6 a 9	4 DTP/DTaP/DT/Td ² 1	Tdap ³ 4	Polio ⁴	3 Hep B	2 MMR ⁵ 2	Var ⁶
Grado 10 a 11	4 DTP/DTaP/DT/Td ² 1	Tdap ³ 4	Polio ⁴	3 Hep B	2 MMR ⁵ 1	Var ⁶
Grade 12	4 DTP/DTaP/DT/Td ² 1	Tdap ³ 4	Polio ⁴	3 Hep B	2 MMR ⁵ 2	Var ⁶

1. DTP/DTaP/DT vacuna para los niños que ingresan a Kindergarten: Su hijo(a) debe haber recibido una dosis después de cumplir 4 años (ya sea en el 3er., 4to. o 5to. dosis) para ser aceptado. (Nota: es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años) .
2. DTP/DTaP/DT/Td vacuna para estudiantes que ingresan a grados 1 al 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3ra. dosis después de cumplir 4 años, no necesita dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años).
3. Tdap es la vacuna antitetánica, antidiftérica y antitosferínica acelular, recomendada para los adolescents. Si su hijo(a) ha recibido una dosis de una vacuna antitetánica o antidiftérica como la vacuna Td en los últimos 5 años, no es necesaria la vacuna Tdap.
4. La vacuna antipoliomelítica para estudiantes que ingresan a los grados Kindergarten a 12: Se requieren 4 dosis. Pero, si su hijo(a) recibió la 3ra. dosis después de cumplir 4 años, no necesita dosis adicionales. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes o al cumplir 4 años).
5. La primera dosis de la vacuna MMR debe recibirse al cumplir un año o después de un año de edad. (Nota: Es aceptable una dosis 4 días antes de cumplir un año).
6. Var se refiere a la vacuna contra la varicela (viruelas locas). También se acepta si ha tenido la varicela.